Surveillance du choléra pour le personnel soignant

Module 3

GLOBAL TASK FORCE ON
CHOLERA CONTROL

Surveillance du choléra pour le personnel soignant

Détection précoce des épidémies

Préparez-vous

Avant de suivre ce module, assurez-vous d'avoir suivi : Module 2 "Principes clés"

Qu'allez-vous apprendre ?

- **Comment** mettre en œuvre la surveillance pour la détection précoce :
  - Comment identifier les **patients suspects de choléra**
  - Quels patients suspects de choléra **tester**
  - Quand **notifier** les patients suspects de choléra

Contexte

Photo adaptée de : OMS/Billy Miaron

Détection précoce

Lorsqu'il n'y a PAS d'épidémie de choléra dans votre zone géographique

Photo adaptée de : OMS / Francine Tchouta

- Les autorités sanitaires informent régulièrement le personnel soignant de la **situation du choléra dans leur zone géographique**

- **Restez informé**

- À tout moment, sachez :
  - La **situation du choléra dans votre zone géographique**
  - Si la surveillance vise la détection précoce

Objectif

La détection précoce permet la mise en œuvre rapide de mesures pour réduire la propagation et limiter le nombre de cas et de décès

Identifiez, testez et notifiez les patients suspects de choléra conformément aux recommandations de ce module

- Tant qu'aucune épidémie de choléra n'est détectée
- Si une épidémie est détectée, la surveillance évolue

Modules 4 & 5 : Surveillance dans les autres situations

Patients suspects de choléra

Photo adaptée de : Abba Adamu Musa

Définition de cas

Patient suspect de choléra

- **Patient ≥ 2 ans souffrant de DAA et de déshydratation sévère**

  ou

- **Patient ≥ 2 ans décédé de DAA**

Module 2 : Reconnaître la DAA et la déshydratation sévère

- Diverses maladies peuvent être à l'origine de DAA, en particulier chez les jeunes enfants

Critères âge & déshydratation sévère

- **Plus probable** que les patients suspects de choléra en soient atteints
- **Évite** de déclencher de fréquentes **fausses alertes** au choléra
- **Améliore l'efficacité** de la surveillance et de la détection précoce

Tests pour le choléra

Photo adaptée de : OMS/Fid Thompson

Stratégie de test

Tous les patients suspects de choléra sont testés
Essentiel pour déterminer si le choléra circule ou non

Si des TDR sont disponibles

- TDR pour **trier** les échantillons pour confirmation

- **TOUS les patients** suspects de choléra sont **testés par TDR**
- Echantillons de **TOUS les patients TDR+** envoyés à un laboratoire pour **confirmation**

Si les TDR ne sont PAS disponibles

- Echantillons **non triés** pour confirmation

- Echantillons de **TOUS les patients** suspects de choléra envoyés à un laboratoire pour **confirmation**

Notifier le choléra

Photo adaptée de : Raissa Karama Rwizibuka/Wellcome Trust

Notification du choléra

Si un patient suspect de choléra est vu dans votre établissement, les informations standard recueillies sur ce patient sont notifiées le jour même aux autorités sanitaires

- Il est essentiel de notifier le jour même pour ne pas retarder la détection d'une épidémie

Le temps est clé !

Module 2 : Informations standard à collecter et à notifier

- Si, au cours d'une semaine, aucun patient suspect de choléra n'a été vu dans votre établissement
  - Notifier l'**absence de cas** à la fin de la semaine
- Pour notifier, utilisez les canaux et les mécanismes en place dans votre établissement (par exemple, point focal)

Points saillants

- **Dans les zones géographiques où il n'y a PAS d'épidémie de choléra, la surveillance est pour la détection précoce**
- Les patients suspects de choléra sont âgés de **2 ans ou plus avec DAA et présentent des signes de déshydratation sévère** (ou décédés de DAA)
- **Tous les patients suspects de choléra sont testés**
- **Les informations standard** sur ces patients sont **notifiées sous 24 heures**
- Si aucun patient suspect de choléra n'a été vu au cours d'une semaine, ceci est notifié à la fin de la semaine

Quiz

Question 1

- **Pour la détection précoce d'une épidémie de choléra, un patient suspect de choléra est un patient :**

  a) Âgé ≥ 2 ans avec diarrhée aqueuse aiguë

  b) Avec diarrhée aqueuse aiguë et déshydratation sévère

  c) Âgé ≥ 2 ans avec diarrhée aqueuse aiguë et déshydratation sévère

  d) Avec diarrhée aqueuse aiguë

Question 1 - Réponse

- **Pour la détection précoce d'une épidémie de choléra, un patient suspect de choléra est un patient :**

a) Âgé ≥ 2 ans avec diarrhée aqueuse aiguë

b) Avec diarrhée aqueuse aiguë et déshydratation sévère

c) Âgé ≥ 2 ans avec diarrhée aqueuse aiguë et déshydratation sévère

d) Avec diarrhée aqueuse aiguë

Question 2

Pour la détection précoce d'une épidémie de choléra :
(Plusieurs réponses possibles)

a) Tout patient suspect de choléra est notifié quotidiennement
b) Tout patient suspect de choléra est notifié chaque semaine
c) L'absence de patient suspect de choléra est notifiée quotidiennement
d) L'absence de patient suspect de choléra est notifiée chaque semaine

Question 2 - Réponses

Pour la détection précoce d'une épidémie de choléra :

a) Tout patient suspect de choléra est notifié quotidiennement

b) Tout patient suspect de choléra est notifié chaque semaine

c) L'absence de patient suspect de choléra est notifiée quotidiennement

d) L'absence de patient suspect de choléra est notifiée chaque semaine

Question 3

- **Pour la détection précoce d'une épidémie de choléra, tout patient avec une diarrhée aqueuse aiguë est testé pour le choléra**

  a) Vrai

  b) Faux

Question 3 - Réponse

- **Pour la détection précoce d'une épidémie de choléra, tout patient avec une diarrhée aqueuse aiguë est testé pour le choléra**

a) Vrai

b) Faux

Together we can
#Endcholera
GLOBAL TASK FORCE ON
CHOLERA CONTROL